

Notation asymptotique


Notation Grand O

Étant donné des fonctions $f(n)$ et $g(n)$, on dit que

$$f(n) \text{ est } \mathcal{O}(g(n))$$

s'il existe des constantes $c > 0$ et $n_0 \geq 1$ telles que

$$f(n) \leq cg(n) \quad \forall n, n \geq n_0$$



Grand O et taux de croissance

- La notation grand O donne une borne supérieure du taux de croissance d'une fonction.
- La phrase “ $f(n)$ est $O(g(n))$ ” signifie donc que le taux de croissance de $f(n)$ est plus petit ou égal au taux de croissance de $g(n)$.
- On peut utiliser la notation O pour ordonner les fonctions à partir de leur taux de croissance.

$$1 \leq \log n \leq n \leq n \log n \leq n^2 \leq 2^n \leq n^n$$

- La notation grand O est réflexive et transitive.

Propriétés de \mathcal{O}

1) Règle du seuil: Si f et t sont 2 fonctions strictement positives de $\mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}^+$, alors

$$t(n) \in \mathcal{O}(f(n)) \iff \exists c' \in \mathbb{R}^+ \text{ tel que } \forall n \in \mathbb{N}, t(n) \leq c' f(n)$$

2) Règle du maximum: Soient f et t deux fonctions de $\mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}^+$, alors

$$\mathcal{O}(f(n) + t(n)) = \mathcal{O}(\max(f(n), t(n)))$$

3) Si $f(n) \in \mathcal{O}(h_1(n))$ et $g(n) \in \mathcal{O}(h_2(n))$, alors $(f \cdot g)(n) \in \mathcal{O}(h_1 \cdot h_2(n))$

4) $\mathcal{O}(f(n)) = \mathcal{O}(g(n)) \iff f(n) \in \mathcal{O}(g(n))$ et $g(n) \in \mathcal{O}(f(n))$

Rappel: logarithmes et exposants

Propriétés des logarithmes

$$\log_b(xy) = \log_b(x) + \log_b(y)$$

$$\log_b(x/y) = \log_b(x) - \log_b(y)$$

$$\log_b(x^a) = a \log_b(x)$$

Propriétés des exposants

$$a^{(b+c)} = a^b a^c$$

$$a^{bc} = (a^b)^c$$

$$a^b / a^c = a^{b-c}$$

Grand Ω et grand Θ

- Grand Ω

Étant donné des fonctions $f(n)$ et $g(n)$, on dit que

$f(n)$ est $\Omega(g(n))$

s'il existe des constantes $c > 0$ et $n_0 \geq 1$ telles que

$$f(n) \geq cg(n) \quad \forall \text{entier } n \geq n_0$$

- Grand Θ

Étant donné des fonctions $f(n)$ et $g(n)$, on dit que

$f(n)$ est $\Theta(g(n))$

si $f(n)$ est $O(g(n))$ et $f(n)$ est $\Omega(g(n))$, i.e s'il existe des constantes $c_1 > 0$, $c_2 > 0$ et $n_0 \geq 1$ tels que

$$c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n) \quad \forall n \geq n_0$$

Intuition: notation asymptotique

- Grand O

$f(n)$ est $O(g(n))$ si $f(n)$ est asymptotiquement plus petite ou égale à $g(n)$

- Grand Ω

$f(n)$ est $\Omega(g(n))$ si $f(n)$ est asymptotiquement plus grande ou égale à $g(n)$

- Grand Θ

$f(n)$ est $\Theta(g(n))$ si $f(n)$ est asymptotiquement égale à $g(n)$