



DIRO  
IFT 2425

## INTRA

*Max Mignotte*

DIRO, Département d'Informatique et de Recherche Opérationnelle, local 2384.

<http://www.iro.umontreal.ca/~mignotte/ift2425/>

*E-mail : mignotte@iro.umontreal.ca*

I .....	Mesure d'incertitude.
II .....	Méthode du point fixe et de Newton-Raphson.
III .....	Convergence linéaire et quadratique.
IV .....	Norme de Matrice.
V .....	Factorisation $P^t LU$ avec élimination Gaussienne.
VI .....	Interpolation de lagrange et Newton.

## I. Mesure d'incertitude (15 pts)

Calculer l'erreur absolue et relative sur la durée des oscillations d'un pendule simple de longueur  $l$ . La période est donnée par la formule

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}},$$

si  $\pi = 3.141$  à  $10^{-3}$  près (i.e.,  $\Delta\pi = 10^{-3}$ ),  $l = 1$  m à  $10^{-3}$  près, et  $g = 9.81$  ms $^{-2}$  à  $10^{-2}$  près. Donner l'approximation de  $T$  et arrondir au nombre de cse adéquat.

## II. Méthode du point fixe et de Newton-Raphson (25 pts)

On se propose de trouver des valeurs approchées de la racine  $r$  de l'équation

$$f(x) = x^3 + x - 1 = 0.$$

### 1. Méthode du point fixe.

- En remarquant que l'équation proposée est équivalente à  $g_1(x) = x$  avec  $g_1(x) = \frac{1}{1+x^2}$ , montrer que l'intervalle  $J_1 = [0, 1]$  est un intervalle sur lequel la convergence vers une solution unique est assurée.
- Déterminer analytiquement un majorant de  $|r_n - r|$ , où  $r_n$  désigne la valeur approchée, à la  $n$ ième itération, de cette racine par la méthode itérative du point fixe.
- En déduire une valeur approchée de  $r$  à  $10^{-3}$  près en partant de  $r_0 = 1$  et arrondir au nombre adéquat de cse.

### 2. Méthode de Newton-Raphson.

- Soit  $g_2(x)$ , la fonction intervenant dans la méthode itérative de Newton pour la résolution de cette équation. Donner  $g_2(x)$ .
- Montrer que pour  $x > 0$ , on a l'inégalité suivante

$$|g_2'(x)| \leq 1.125 |f(x)|.$$

- Montrer que l'on a une solution unique sur l'intervalle  $J_2 = [0.5, 0.75]$  et que le choix de cet intervalle permet d'assurer la convergence de la méthode de Newton.
- Trouver analytiquement une majoration du type

$$|r_{n+1} - r| \leq K |r_{n+1} - r_n|.$$

- En déduire une valeur approchée de  $r$  à  $10^{-6}$  près en partant de  $r_0 = 1$  et arrondir au nombre adéquat de cse.

### III. Convergence linéaire et quadratique (15 pts)

Soit deux méthodes itératives dont la constante asymptotique est  $C = 0.75$  et convergeant linéairement pour la première et quadratiquement pour la seconde. Calculer le nombre d'itération minimal pour que l'erreur d'approximation n'excède pas  $10^{-8}$  dans les deux cas sachant que l'erreur à la première itération n'excède pas 0.5 (i.e.,  $e_0 = 0.5$ ).

### IV. Norme de Matrice (5 pts)

Montrer que pour une matrice symétrique  $A$ , on a l'égalité suivante

$$\text{cond}(A)_1 = \text{cond}(A)_\infty.$$

### V. Factorisation $P^tLU$ avec élimination Gaussienne (20 pts)

1. Décomposer la matrice  $A$  en produit  $P^tLU$  où  $P$  est la matrice de permutation par la méthode d'élimination de Gauss et pivotage partiel.
2. Calculer le déterminant de  $A$ .
3. Résoudre le système  $Ax = b$  pour  $b = (1, 2, 3)^t$ .

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 4 & -1 & 2 \\ -6 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

### VI. Interpolation de lagrange et Newton (20 pts)

Soit les points suivants

$x_k$	0	1	4	6
$y_k$	1	-1	1	-1

1. Appliquez la formule de Lagrange pour trouver un polynôme de degré trois qui passe par ces points. Evaluez ensuite ce polynôme pour  $x = 2, 3, 5$ .
2. Appliquez la formule de Newton pour trouver un polynôme de degré trois qui passe par ces points. Evaluez ensuite ce polynôme pour  $x = 2, 3, 5$ .