



**DIRO**  
**IFT 2425**

## ERRATA

Voici une liste de petites erreurs de typos qui se sont glissées dans vos notes de cours.

### - Chapitre 1

- Chapitre 1 - Page 11 - 2<sup>ième</sup> encadré, 2<sup>ième</sup> ligne, on devrait lire,

$$403000 \times 0.0197 \rightarrow .403 \times 10^6 \times .197 \times 10^{-1}$$

- Chapitre 1 - Page 16 - 5<sup>ième</sup> ligne. On devrait lire,

$$\Delta Q = |\pi - \pi^*| = 0.0012644 \dots \leq 0.005 \leq 0.5 10^{-2}$$

- Chapitre 1 - Page 17. En milieu de page, on devrait lire,  
*Plus que 4 CSE, problème*

- Chapitre 1 - Page 18. On devrait lire,

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \dots$$

- Chapitre 1 - Page 21 - 7 - 8<sup>ième</sup> ligne.

$$F(X) \in [1.11063, 1.11108]$$

$$F(X) = 1.11086 \dots$$

### - Chapitre 2

- Chapitre 2 - Page 2. Avant dernière ligne,  
L est une fonction de  $C$  minimal si,

$$\frac{dL}{dC} = \frac{W_2 \cos(B)}{\sin^2(B)} - \frac{W_1 \cos(C)}{\sin^2(C)}$$

$$\frac{dL}{dC} = \frac{W_2 \cos(\pi - A - C)}{\sin^2(\pi - A - C)} - \frac{W_1 \cos(C)}{\sin^2(C)} = 0$$

- Chapitre 2 - Page 17. Avant la courbe,  $\tan(\theta) = \frac{-F(X_1)}{X_2 - X_1}$
- Chapitre 2 - Page 29. Écrire  $e_n = |x_n - x^*|$  en 6<sup>ième</sup> et dernière ligne.
- Chapitre 2 - Page 33. Corriger  $|e_{n+1}| = |g'(\xi_n)| |e_n|$  (au milieu de la page).
- Chapitre 2 - Page 36. Dans la remarque : “... est que la valeur absolue de la pente de  $g$  soit inférieure ...”

- Chapitre 2 - Page 37. Mettre une valeur absolue à  $g'(x)$  et  $|g'(x)| \leq 1$  (dans le premier cas) Toujours **sauf sur**  $[2 - \sqrt{3}; 2 + \sqrt{3}]$ .
- Chapitre 2 - Page 39. Le  $x$  dans la fraction de l'avant avant dernière ligne est en fait  $X$ .
- Chapitre 2 - Page 40. On doit lire,

$$\Delta X_{n+1} = C(\Delta X_n)^2 \leq 0.000025$$

## – Chapitre 3

- Chapitre 3 - Page 2. On doit lire  $V = RI$ .
- Chapitre 3 - Page 17.  $U_{13} = a_{13}/L_{11}$ .
- Chapitre 3 - Page 20. Dans l'encadré et pour les éléments de  $U$ , on doit lire :  $i < j$ .
- Chapitre 3 - Page 23. Ajouter dans l'algorithme, entre la 3<sup>ième</sup> et 4<sup>ième</sup> ligne,

```

FAIRE POUR  $j = 1$  TO  $n$ 
   $U[1, j] = A[1, j]/L[1, 1]$ 
  FIN FAIRE POUR

```

- Chapitre 3 - Page 26. On doit lire

$$L.U. \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- Chapitre 3 - Page 28. Après l'encadré, il faut lire *Minimiser la norme de  $r$ . Minimisons ici.*
- Chapitre 3 - Page 31. Il faut lire *avec  $a_n$  tous non nuls.*
- Chapitre 3 - Page 33. Pour la première matrice de l'égalité  $A=LU$ , il faut lire pour  $L$ ,

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 6 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

- Chapitre 3 - Page 40. Pour la deuxième propriété de la norme d'une matrice, enlever  $\|A\| \geq 0$
- Chapitre 3 - Page 49. Dans le premier encadré, écrire à la fin (plus précisément)  $\text{cond}(A) \approx 1$ .
- Chapitre 3 - Page 58. 5<sup>ième</sup> ligne avant la fin, écrire,

$$x^{n+1} = G(x^n) = b' - Bx^n$$

- Chapitre 3 - Page 59. Petite erreur dans la solution de la matrice  $U$ , on doit lire,

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- Chapitre 3 - Page 60. Dans l'encadré, on doit lire “*pour que chaque élément de la diagonale soit le plus grand des éléments de sa ligne*”.

- Chapitre 3 - Page 62. Dans l'encadré, on doit lire “pour que chaque élément de la diagonale soit le plus grand des éléments de sa ligne”.
- Chapitre 3 - Page 63. Pour la formule itérative de la relaxation, il faut lire

$$x_i^{n+1} = x_i^n + \dots$$

## - Chapitre 4

- Chapitre 4 - Page 15. À la dernière ligne, on devrait lire,  $0.00218 \leq E(0.8) \leq 0.00348$ .
- Chapitre 4 - Page 41. À la dernière ligne, Équation 19, on devrait lire,  $y' = \dots$
- Chapitre 4 - Page 42. À l'Equation 21, on devrait lire,  $y' = \dots$
- Chapitre 4 - Page 46. Enlever le mot *parabolique* dans la deuxième phrase.
- Chapitre 4 - Page 77. À la première ligne, il faut lire,

$$\text{Interpolation en } x \text{ pour } y = 0.33$$

- Chapitre 4 - Page 80. À la dernière ligne, on devrait lire,

$$P(1.6, 0.33) = 1.8406$$

- Chapitre 4 - Page 84. Mettre  $Y_i$  au lieu de  $y_i$  dans le dernier encadré de la page. En milieu de page, on devrait lire,

$$R_2 \quad \min \rightarrow \frac{\partial R_2}{\partial a} = 0 \quad \text{et} \quad \frac{\partial R_2}{\partial b} = 0$$

- Chapitre 4 - Page 87. Remplacer  $\sum_{i=1}^m x_i$  dans le vecteur de droite de la matrice par  $\sum_{i=1}^m y_i$

## - Chapitre 5

- Chapitre 5 - Page 6. Au milieu de la page, on devrait lire,  

$$-0.669_{x=1.9} \leq E'_1(1.7) \leq -0.547_{x=1.7}$$
- Chapitre 5 - Page 15. colonne de droite, 8ieme ligne, on devrait lire

$$f'(2.5) = (f_2 - f_{-2})/4h + O(4h^2)$$

- Chapitre 5 - Page 23. À la cinquième ligne, on devrait lire “Intègre exactement un polynôme de degré un puisque  $f''(\xi_1) = 0$  dans ce cas”.
- Chapitre 5 - Page 35. À la dernière ligne, colonne de gauche, on doit lire ,

$$= T_{2,n/4} + o((2h)^4).$$

- Chapitre 5 - Page 39. Dans l'encadré, on devrait lire

$$P_n = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

- Chapitre 5 - Page 41. Pour la dernière ligne de l'encadré, on devrait lire,

$$t_1, t_2, \dots, t_n \quad \text{sont les zéros du} \dots$$

- Chapitre 5 - Page 49. À gauche du petit encadré, on devrait lire,

$$\frac{x-0}{t+1} = \frac{0.5}{2}$$

- Chapitre 5 - Page 50. On devrait lire (5<sup>ième</sup> avant la fin)

$$\int_{x_0}^{x_3} P_3(x) dx = \frac{3}{8} h [ y_0 + 3y_1 + 3y_2 + y_3 ]$$

- Chapitre 5 - Page 59. On doit lire pour la dernière formule,

$$\begin{aligned} \int_{0.2}^{0.6} F(y) dy &= \frac{h}{3} (F_1 + 4F_2 + 2F_3 + 4F_4 + F_5) \\ &= \frac{0.1}{0.3} (3.3140 + 4(5.0070) + 2(6.6522) + 4(8.2368) + 9.7435) \end{aligned}$$

## - Chapitre 6

- Chapitre 6 - Page 8. Remplacer les 2  $t_n$  par  $x_n$ .
- Chapitre 6 - Page 17. Pour la méthode de Runge Kutta Fehlberg d'ordre global 5 utilisé la formule donnée par votre livre de référence page 462.
- Chapitre 6 - Page 20. Avant l'encadré, l'équation est,

$$P_2(S) = f_n + s\Delta f_{n-1} + \frac{s(s+1)}{2} \Delta^2 f_{n-2} + \frac{s(s+1)(s+2)}{6} h^3 f'''(\xi)$$

- Chapitre 6 - Page 26. Remplacer le  $f$  de la deuxième équation des différents système de ce slide par  $g$  : Exemple : la deuxième équation du premier système devrait être écrite comme suit :  $\tilde{y}_{j+1} = y_j + hg(t_j, y(t_j))$
- Chapitre 6 - Page 27. La solution de l'équation du pendule est (dernière ligne),

$$\theta(t) = \theta_0 \cos\left(\sqrt{\frac{g}{L}} t\right) + \sqrt{\frac{L}{g}} \theta'_0 \sin\left(\sqrt{\frac{g}{L}} t\right)$$

- Chapitre 6 - Page 30. Pour le système écrit en milieu de page, on devrait lire,

$$\begin{aligned} x_{j+1} &= x_j + h f(t_j, x(t_j), y(t_j)) \\ y_{j+1} &= y_j + h g(t_j, x(t_j), y(t_j)) \end{aligned}$$

- Chapitre 6 - Page 43.

$$x_{2i+1}^{(extrapolation)} = x_{2i+1}^{(1)} + \frac{1}{3} (x_{2i+1}^{(1)} - x_{2i+1}^{(2)})$$

## - Chapitre 7

- Chapitre 7 - Page 04. Pour  $\lambda_2 = 4$  et  $\lambda_3 = -1$  les solutions sont respectivement,

$$x_1 = 0, \quad x_2 = 1, \quad x_3 = -1$$

et

$$x_1 = 0, \quad x_2 = 1, \quad x_3 = -2/7.$$

- Chapitre 7 - Page 12. On devrait lire en première ligne, *Or nous avons*  $|\frac{\lambda_2}{\lambda_1}| < 1$
- Chapitre 7 - Page 14. Pour l'avant dernière matrice, on devrait lire,

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0.06129 \\ 0.02962 \end{pmatrix}$$

- Chapitre 7 - Page 18. Pour la deuxième ligne, on devrait lire

$$\frac{1094}{1089}$$

(et non pas  $\frac{1094}{1084}$ ).

On devrait lire pour les trois avant dernière égalité ;

$$A^{[1]} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{[1]} y^{[1]}$$

et,

$$A^{[1]} y^{[k]}$$