

Modèles stochastiques

Chaînes de Markov discrètes

1. Processus stochastique discret

Suite de variables aléatoires $\{X_t\}, t \in T$

T est un ensemble d'entiers non-négatifs et

X_t représente une mesure d'une caractéristique au temps t

2. Processus stochastique discret avec un espace d'états fini

Processus stochastique décrivant l'évolution d'un système qui est modifié dans le temps.

Structure:

$M + 1$ états mutuellement exclusifs: $0, 1, \dots, M$

$X_t =$ état du système au temps t : $X_t \in \{0, 1, \dots, M\}$

$\{X_t\} = \{X_0, X_1, \dots\}$ représentation du statut du système dans le temps.

2. Processus stochastique discret avec une espace d'états fini

Processus stochastique décrivant l'évolution d'un système qui est modifié dans le temps.

Structure:

$M + 1$ états mutuellement exclusifs: $0, 1, \dots, M$

$X_t =$ état du système au temps t : $X_t \in \{0, 1, \dots, M\}$

$\{X_t\} = \{X_0, X_1, \dots\}$ représentation du statut du système dans le temps.

Exemple de la météo

Évolution de la météo d'un jour à l'autre. Souvent la météo à un jour donné peut dépendre de la météo de la veille.

Observations sur les jours $t = 0, 1, \dots$

États de la météo le jour t :

état 0: beau

état 1: pluie.

Dénotons

$$X_t = \begin{cases} 0 & \text{beau le jour } t \\ 1 & \text{pluie le jour } t. \end{cases}$$

Processus stochastique $\{X_t\} = \{X_0, X_1, \dots\}$

3. Chaînes de Markov

Propriété markovienne est souvent une hypothèse souvent faite pour faciliter l'étude d'un processus stochastique $\{X_t\} = \{X_0, X_1, \dots\}$.

Le processus stochastique $\{X_t\} = \{X_0, X_1, \dots\}$ est une **chaîne de Markov** (ou possède la **propriété markovienne**) si

$$P(X_{t+1} = j \mid X_0 = k_0, X_1 = k_1, \dots, X_t = i) = P(X_{t+1} = j \mid X_t = i).$$

Probabilité conditionnelle de l'état demain X_{t+1} étant donné les états passés $(0, 1, \dots, t-1)$ et de celui d'aujourd'hui t est indépendante des états passés; i.e., probabilité conditionnelle de l'état de demain X_{t+1} dépend uniquement de l'état d'aujourd'hui X_t .

Le processus stochastique est dit **sans mémoire**

4. Probabilités de transition

Probabilités de transition entre deux moments consécutifs t et $(t+1)$

$$p_{ij} = P(X_{t+1} = j | X_t = i) = P(X_1 = j | X_0 = i) \quad \forall i, j \in \{0, \dots, M\}$$

Propriétés:

$$p_{ij} \geq 0 \quad \forall i, j \in \{0, \dots, M\}$$

$$\sum_{j=0}^M p_{ij} = 1 \quad \forall i \in \{0, \dots, M\}$$

probabilités de transition restent **stationnaires** dans le temps

$$P(X_{t+1} = j | X_t = i) = P(X_1 = j | X_0 = i) \quad \forall i, j \in \{0, \dots, M\}$$

Exemple de la météo:

$$p_{00} = P(X_{t+1} = 0 | X_t = 0) = 0.8$$

$$p_{10} = P(X_{t+1} = 0 | X_t = 1) = 0.6$$

$$p_{00} + p_{01} = 1 \Rightarrow p_{01} = 1 - p_{00} = 1 - 0.8 = 0.2$$

$$p_{10} + p_{11} = 1 \Rightarrow p_{11} = 1 - p_{10} = 1 - 0.6 = 0.4$$

$$P(\text{beau demain} | \text{beau aujourd'hui}) = 0.8$$

$$P(\text{beau demain} | \text{pluie aujourd'hui}) = 0.6$$

$$X_t = \begin{cases} 0 & \text{beau le jour } t \\ 1 & \text{pluie le jour } t. \end{cases}$$

4. Probabilités de transition

Probabilités de transition entre deux moments consécutifs t et $(t+1)$

$$p_{ij} = P(X_{t+1} = j | X_t = i) = P(X_1 = j | X_0 = i) \quad \forall i, j \in \{0, \dots, M\}$$

Matrice de transitions

$$\begin{array}{c} \text{états} \\ \left[\begin{array}{c} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ M \end{array} \right] \end{array} P = \begin{array}{c} \left[\begin{array}{cccc} 0 & 1 & \dots & M \end{array} \right] \\ \left[\begin{array}{cccc} p_{00} & p_{01} & \dots & p_{0M} \\ p_{10} & p_{11} & \dots & p_{1M} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ p_{M0} & p_{M1} & \dots & p_{MM} \end{array} \right] \end{array}$$

Exemple de la météo:

$$p_{00} = P(X_{t+1} = 0 | X_t = 0) = 0.8$$

$$p_{10} = P(X_{t+1} = 0 | X_t = 1) = 0.6$$

$$p_{00} + p_{01} = 1 \quad \Rightarrow \quad p_{01} = 1 - p_{00} = 1 - 0.8 = 0.2$$

$$p_{10} + p_{11} = 1 \quad \Rightarrow \quad p_{11} = 1 - p_{10} = 1 - 0.6 = 0.4$$

$$P = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.6 & 0.4 \end{bmatrix}$$

Exemple du jeu:

Tant qu'un joueur a de l'argent en main, il joue en misant \$1.

Il gagne \$1 avec une probabilité de p .

Il perd sa mise (\$1) avec une probabilité de $(1-p)$.

Le jeu s'arrête lorsque le joueur n'a plus d'argent ou lorsqu'il a \$3 en main.

États (somme que le joueur peut avoir en main): 0, 1, 2, 3

Matrice de transition

$$\begin{array}{c} \text{états} \\ \left[\begin{array}{c} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{array} \right] \end{array} P = \begin{array}{c} \left[\begin{array}{cccc} 0 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right] \\ \left[\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ (1-p) & 0 & p & 0 \\ 0 & (1-p) & 0 & p \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \end{array}$$

5. Équations de Chapman-Kolmogorov

Probabilités de transition entre les deux moments t et $(t+n)$

(incluant n transitions)

$$p_{ij}^{(n)} = P(X_{t+n} = j | X_t = i) = P(X_n = j | X_0 = i) \quad \forall i, j \in \{0, \dots, M\}$$

Les **équations de Chapman-Kolmogorov** permettent de déterminer les probabilités de transition $p_{ij}^{(n)}$ à partir des probabilités de transition entre deux moments consécutifs p_{ij} :


$$p_{ij}^{(n)} = \sum_{k=0}^M p_{ik}^{(m)} p_{kj}^{(n-m)} \quad \forall i, j \in \{0, \dots, M\}$$
$$m = 1, 2, \dots, n-1$$
$$n = m+1, m+2, \dots$$

Les **équations de Chapman-Kolmogorov** permettent de déterminer les probabilités de transition $p_{ij}^{(n)}$ à partir des probabilités de transition entre deux moments consécutifs p_{ij} :

$$p_{ij}^{(n)} = \sum_{k=0}^M p_{ik}^{(m)} p_{kj}^{(n-m)} \quad \forall i, j \in \{0, \dots, M\}$$

$$m = 1, 2, \dots, n-1$$

$$n = m+1, m+2, \dots$$



On doit considérer tous les états k comme intermédiaires.

Probabilités de transition entre les deux moments t et $(t+n)$
(incluant n transitions)

$$p_{ij}^{(n)} = P(X_{t+n} = j | X_t = i) = P(X_n = j | X_0 = i) \quad \forall i, j \in \{0, \dots, M\}$$

$$p_{ij}^{(2)} = \sum_{k=0}^M p_{ik} p_{kj} \quad \forall i, j \in \{0, \dots, M\} \longrightarrow P^{(2)} = PP$$

$$p_{ij}^{(n)} = \sum_{k=0}^M p_{ik} p_{kj}^{(n-1)} \quad \forall i, j \in \{0, \dots, M\} \longrightarrow P^{(n)} = PP^{(n-1)} = PP^{n-1}$$

$$p_{ij}^{(n)} = \sum_{k=0}^M p_{ik}^{(n-1)} p_{kj} \quad \forall i, j \in \{0, \dots, M\} \longrightarrow P^{(n)} = P^{(n-1)}P = P^{n-1}P$$

Probabilités de transition entre les deux moments t et $(t+n)$

(incluant n transitions)

$$P_{ij}^{(n)} = P(X_{t+n} = j | X_t = i) = P(X_n = j | X_0 = i) \quad \forall i, j \in \{0, \dots, M\}$$

Exemple de la météo:

$$P = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.6 & 0.4 \end{bmatrix} \quad P^{(2)} = PP = P^2 = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.6 & 0.4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.6 & 0.4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.76 & 0.24 \\ 0.72 & 0.28 \end{bmatrix}$$

$$P^{(3)} = PP^2 = P^3 = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.6 & 0.4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.76 & 0.24 \\ 0.72 & 0.28 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.752 & 0.248 \\ 0.744 & 0.256 \end{bmatrix}$$

$$P^{(4)} = PP^3 = P^4 = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.6 & 0.4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.752 & 0.248 \\ 0.744 & 0.256 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.75 & 0.25 \\ 0.749 & 0.251 \end{bmatrix}$$

$$P^{(5)} = PP^4 = P^5 = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.6 & 0.4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.75 & 0.25 \\ 0.749 & 0.251 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.75 & 0.25 \\ 0.75 & 0.25 \end{bmatrix}$$

$$P^{(6)} = PP^5 = P^6 = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.6 & 0.4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.75 & 0.25 \\ 0.75 & 0.25 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.75 & 0.25 \\ 0.75 & 0.25 \end{bmatrix}$$

$$P^5 = P^6 = P^7 = P^8 = \dots$$

6. Probabilités non-conditionnelles des états

Dans le cas où n est petit et que le système n'a pas atteint son stage d'équilibre, il faut connaître les probabilités des états au départ (i.e., à $t = 0$)

$$P(X_0 = i) \quad \forall i \in \{0, \dots, M\}.$$

Alors

$$P(X_n = j) = P(X_n = j \& X_0 = 0) + \dots + P(X_n = j \& X_0 = M)$$

$$\begin{aligned} P(X_n = j) &= P(X_n = j | X_0 = 0)P(X_0 = 0) + \dots + P(X_n = j | X_0 = M)P(X_0 = M) \\ &= p_{0j}^{(n)}P(X_0 = 0) + \dots + p_{Mj}^{(n)}P(X_0 = M) \end{aligned}$$

Exemple de la météo:

Supposons que $P(X_0 = 0) = 0.3$ et $P(X_0 = 1) = 0.7$

Quelle est la probabilité qu'il pleuve le jour 3, $P(X_3 = 1)$?

$$P^{(3)} = \begin{bmatrix} 0.752 & 0.248 \\ 0.744 & 0.256 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} P(X_3 = 1) &= p_{01}^3 P(X_0 = 0) + p_{11}^3 P(X_0 = 1) \\ &= 0.248 \cdot 0.3 + 0.256 \cdot 0.7 \\ &= 0.0744 + 0.1792 = 0.2536 \end{aligned}$$

7. Classification des états d'une chaîne de Markov

Un état j est **accessible** à partir de l'état i si

$$p_{ij}^{(n)} > 0 \text{ pour un certain } n > 0$$

Exemple de la météo:

Les états 0 et 1 sont accessibles à partir des états 0 et 1 puisque

$$P = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.6 & 0.4 \end{bmatrix} \Leftrightarrow p_{ij} > 0 \quad \forall i, j \in \{0, 1\}.$$

Un état j est **accessible** à partir de l'état i si

$$p_{ij}^{(n)} > 0 \text{ pour un certain } n > 0$$

Exemple du jeu:

L'état 3 est accessible à partir de l'état 2 car

$$p_{23} = p > 0$$

Les états 0, 1, 2 ne sont pas accessibles à partir de l'état 3 car on ne peut repartir vers d'autres états à partir de 3 $\Rightarrow p_{30}^{(n)} = 0, p_{31}^{(n)} = 0, p_{32}^{(n)} = 0 \quad \forall n > 0$

Tant qu'un joueur a de l'argent en main, il joue en misant \$1.

Il gagne \$1 avec une probabilité de p .

Il perd sa mise (\$1) avec une probabilité de $(1-p)$.

Le jeu s'arrête lorsque le joueur n'a plus d'argent ou lorsqu'il a \$3 en main.

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ (1-p) & 0 & p & 0 \\ 0 & (1-p) & 0 & p \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Les états i et j **communiquent** si

l'état i est accessible à partir de l'état j et l'état j est accessible à partir de l'état i

- i communique avec lui-même ($p_{ii}^0 = P(X_0 = i | X_0 = i) = 1$)
- i communique avec $j \iff j$ communique avec i
- i communique avec k et k communique avec $j \implies i$ communique avec j

$$\begin{array}{l} \exists n_1 > 0 \text{ tel que } p_{ik}^{(n_1)} > 0 \quad \text{et} \quad \exists n_2 > 0 \text{ tel que } p_{kj}^{(n_2)} > 0 \\ \text{Donc} \quad p_{ij}^{(n_1+n_2)} = \sum_{l=0}^M p_{il}^{(n_1)} p_{lj}^{(n_2)} \geq p_{ik}^{(n_1)} p_{kj}^{(n_2)} > 0 \end{array}$$

Exemple de la météo:

Les états 0 et 1 communiquent

$$P = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.6 & 0.4 \end{bmatrix} \iff p_{ij} > 0 \quad \forall i, j \in \{0, 1\}.$$

Les états i et j **communiquent** si

l'état i est accessible à partir de l'état j et l'état j est accessible à partir de l'état i

- i communique avec lui-même ($p_{ii}^0 = P(X_0 = i | X_0 = i) = 1$)
- i communique avec $j \iff j$ communique avec i
- i communique avec k et k communique avec $j \implies i$ communique avec j

Exemple du jeux:

Les états 1 et 2 communiquent

$$\begin{array}{l} \text{états} \\ \left[\begin{array}{c} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{array} \right] \end{array} P = \begin{array}{c} \left[\begin{array}{cccc} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ (1-p) & 0 & p & 0 \\ 0 & (1-p) & 0 & p \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \end{array}$$

Une **classe** est un sous-ensemble **de tous les** états communiquant entre eux.

... the states may be partitioned into one or more separate **classes** such that those states that communicate with each other are in the same class. **H.L.**

Une **classe** est un sous-ensemble **de tous les** états communiquant entre eux.

Une chaîne de Markov est **irréductible** si elle ne comporte qu'une seule classe.

Exemple de la météo:

Les états 0 et 1 communiquent

$$P = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.6 & 0.4 \end{bmatrix} \Leftrightarrow p_{ij} > 0 \quad \forall i, j \in \{0, 1\}. \quad \left. \vphantom{P} \right\} \Rightarrow \text{chaîne de Markov irréductible}$$

Exemple du jeu:

Les états 1 et 2 communiquent

$$\left. \begin{array}{l} \text{états} \\ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \end{array} \right\} P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ (1-p) & 0 & p & 0 \\ 0 & (1-p) & 0 & p \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow 3 \text{ classes: } \{0\}, \{1, 2\}, \{3\}$$

Etat **transient**:

i est un état **transient** si après y avoir accédé (**upon entering this state**), le processus peut ne plus y revenir:

i est transient $\Leftrightarrow \exists j (\neq i)$ accessible de i , mais i n'est pas accessible de j

Exemple du jeux:

$$\begin{array}{l} \text{états} \\ \left[\begin{array}{c} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{array} \right] \end{array} \quad P = \begin{array}{c} \left[\begin{array}{cccc} 0 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right] \\ \left[\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ (1-p) & 0 & p & 0 \\ 0 & (1-p) & 0 & p \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \end{array} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{les états de la classe } \{1,2\} \text{ sont transients:} \\ 0 \text{ accessible de } 1, \text{ mais} \\ 1 \text{ n'est pas accessible de } 0; \\ 3 \text{ accessible de } 2, \text{ mais} \\ 2 \text{ n'est pas accessible de } 3. \end{array} \right.$$

Etat **récurrent**:

i est un état **récurrent** si après y avoir accédé, le processus y reviendra:

i est récurrent $\Leftrightarrow i$ n'est pas transient

A state is said to be **récurrent** if, upon entering this state, the process *definitely will return* to this state again. H.L.

Exemple du jeu:

$$\left. \begin{array}{l} \text{états} \\ \left[\begin{array}{c} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{array} \right] \end{array} \right\} P = \left[\begin{array}{cccc} 0 & 1 & 2 & 3 \\ \begin{array}{c} 1 \\ (1-p) \\ 0 \\ 0 \end{array} & \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ (1-p) \\ 0 \end{array} & \begin{array}{c} 0 \\ p \\ 0 \\ 0 \end{array} & \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ p \\ 1 \end{array} \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{les états 0 et 3 sont récurrents:} \\ \text{après avoir atteint 0 (ou 3)} \\ \text{on y reste, donc on y revient.} \end{array} \right.$$

Une chaîne de Markov est **irréductible** si elle ne comporte qu'une seule classe.

Etat **récurrent**:

i est un état **récurrent** si après y avoir accédé, le processus y reviendra:

i est récurrent $\Leftrightarrow i$ n'est pas transient

Tous les états d'une chaîne de Markov irréductible sont récurrents.

Exemple de la météo:

Les états 0 et 1 communiquent

$$P = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.6 & 0.4 \end{bmatrix} \Leftrightarrow p_{ij} > 0 \quad \forall i, j \in \{0, 1\} \left. \vphantom{\begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.6 & 0.4 \end{bmatrix}} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{chaîne de Markov irréductible} \\ \mathbf{0 \text{ et } 1 \text{ sont récurrents}} \end{array} \right.$$

Etat **absorbant**:

i est un état **absorbant** si après y avoir accédé, le processus ne peut en repartir:

$$i \text{ est absorbant} \Leftrightarrow p_{ii}=1$$

Exemple du jeu:

$$\begin{array}{l} \text{états} \\ \left[\begin{array}{c} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{array} \right] \end{array} \quad P = \begin{array}{c} \left[\begin{array}{cccc} 0 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right] \\ \left[\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ (1-p) & 0 & p & 0 \\ 0 & (1-p) & 0 & p \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \end{array} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{les états 0 et 3 sont absorbants} \\ \text{puisque } p_{00} = p_{33} = 1 \end{array} \right.$$

Exemple pour illustrer les définitions:

$$\begin{array}{l} \text{états} \\ \left[\begin{array}{c} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array} \right] \end{array} \quad P = \begin{array}{c} \left[\begin{array}{ccccc} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \end{array} \right] \\ \left[\begin{array}{ccccc} 0.2 & 0.8 & 0 & 0 & 0 \\ 0.5 & 0.5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.3 & 0.7 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \end{array}$$

Etat **transient**:

i est un état **transient** si après y avoir accédé, le processus peut ne plus y revenir:

i est transient $\Leftrightarrow \exists j (\neq i)$ accessible de i , mais i n'est pas accessible de j

Etat **récurrent**:

i est un état **récurrent** si après y avoir accédé, le processus y reviendra:

i est récurrent $\Leftrightarrow i$ n'est pas transient

Etat **absorbant**:

i est un état **absorbant** si après y avoir accédé, le processus ne peut en repartir:

i est absorbant $\Leftrightarrow p_{ii}=1$

Une **classe** est un sous-ensemble d'états communiquant entre eux.

$\{0,1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}$

2 est récurrent et absorbant

3 est transient puisque $p_{32} > 0$ et $p_{22} = 1$

4 est transient puisque $p_{40} = 1$ et $\begin{cases} p_{04} = 0 \\ p_{01} > 0 \text{ mais } p_{14} = 0 \end{cases}$

Exemple pour illustrer les définitions:

$$\begin{array}{l} \text{états} \\ \left[\begin{array}{c} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array} \right] \end{array} \quad P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0.2 & 0.8 & 0 & 0 & 0 \\ 0.5 & 0.5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.3 & 0.7 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Etat **transient**:

i est un état **transient** si après y avoir accédé, le processus peut ne plus y revenir:

i est transient $\Leftrightarrow \exists j (\neq i)$ accessible de i , mais i n'est pas accessible de j

Etat **récurrent**:

i est un état **récurrent** si après y avoir accédé, le processus y reviendra:

i est récurrent $\Leftrightarrow i$ n'est pas transient

Etat **absorbant**:

i est un état **absorbant** si après y avoir accédé, le processus ne peut en repartir:

i est absorbant $\Leftrightarrow p_{ii}=1$

Une **classe** est un sous-ensemble d'états communiquant entre eux.

$\{0,1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}$

0 et 1 sont récurrents

Tous les éléments d'une classe sont récurrents ou transients.

Il ne peut y avoir une chaîne de Markov dont tous les éléments sont transients.

Période d'un état (Hillier & Lieberman).

i is of **période** d if $p_{ii}^{(n)} = 0$ for all values of n other than $d, 2d, 3d, \dots$ H.L.

et d est la plus grande valeur entière ayant cette propriété.

Exemple du jeu:

Considérons l'état 1 (joueur possède \$1 au départ)

1 → 0

↓ ↙ revient à 1 au temps 2

2 → 1 → 0

↓ ↓ ↙ revient à 1 au temps 4

3 2 → 1 → 0

↓ ↓ ↙ revient à 1 au temps 6

3 2 → 1 → 0

↓ ↓ ↙ revient à 1 au temps 8

3 2 → 1 → 0

↓ ↓

états	[0 1 2 3]
[0]	[1 0 0 0]
1	(1-p) 0 p 0
2	0 (1-p) 0 p
[3]	[0 0 0 1]

donc $d = 2$

Période d'un état (Taylor & Karlin).

La période $d(i)$ de i est le plus grand commun diviseur de tous les entiers n pour lesquels $p_{ii}^{(n)} > 0$. (Par convention, $d(i) = 0$ si $p_{ii}^{(n)} = 0$ pour tout $n \geq 1$.)

Exemple du jeu:

Considérons l'état 1 (joueur possède \$1 au départ)

1 → 0

↓ ↙ revient à 1 au temps 2 $p_{11}^{(2)} > 0$

2 → 1 → 0

↓ ↓ ↙ revient à 1 au temps 4 $p_{11}^{(4)} > 0$

3 2 → 1 → 0

↓ ↓ ↙ revient à 1 au temps 6 $p_{11}^{(6)} > 0$

3 2 → 1 → 0

↓ ↓ ↙ revient à 1 au temps 8 $p_{11}^{(8)} > 0$

3 2 → 1 → 0

↓ ↓

états	[0	1	2	3]
[0]		1	0	0	0
1	$P =$	$(1-p)$	0	p	0
2		0	$(1-p)$	0	p
[3]		0	0	0	1

donc $d(i) = 2$

Période d'un état (Hillier & Lieberman).

i is of **période** d if $p_{ii}^{(n)} = 0$ for all values of n other than $d, 2d, 3d, \dots$ H.L.

et d est la plus grande valeur entière ayant cette propriété.

Période d'un état (Taylor & Karlin).

La **période** $d(i)$ de i est le plus grand commun diviseur de tous les entiers n pour lesquels $p_{ii}^{(n)} > 0$. (Par convention, $d(i) = 0$ si $p_{ii}^{(n)} = 0$ pour tout $n \geq 1$.)

On peut démontrer que la période est la même pour tous les états d'une classe.

i est **apériodique** si sa période $d = 1$

i.e. \exists deux moments consécutifs s et $s + 1$ où $p_{ii}^{(s)} > 0$ et $p_{ii}^{(s+1)} > 0$

i est **apériodique** si sa période $d(i) = 1$

i.e. si $p_{ii}^n > 0$ pour tout $n \geq 1$

i est un état **récurrent** si après y avoir accédé, le processus y reviendra:

i est récurrent $\Leftrightarrow i$ n'est pas transient

Dans une chaîne de Markov avec un espace d'états fini,
un état récurrent qui est apériodique est dit **ergodic**.

Une chaîne de Markov avec un espace d'états fini est **ergodic**,
si tous ses états sont **ergodics**.

6. Probabilités non-conditionnelles des états

Dans le cas où n est petit et que le système n'a pas atteint son stage d'équilibre, il faut connaître les probabilités des états au départ (i.e., à $t = 0$)

$$P(X_0 = i) \quad \forall i \in \{0, \dots, M\}.$$

Alors

$$\begin{aligned} P(X_n = j) &= P(X_n = j | X_0 = 0)P(X_0 = 0) + \dots + P(X_n = j | X_0 = M)P(X_0 = M) \\ &= p_{0j}^{(n)}P(X_0 = 0) + \dots + p_{Mj}^{(n)}P(X_0 = M) \end{aligned}$$

Exemple de la météo:

Supposons que $P(X_0 = 0) = 0.3$ et $P(X_0 = 1) = 0.7$

Quelle est la probabilité qu'il pleuve le jour 3, $P(X_3 = 1)$?

$$\begin{aligned} P(X_3 = 1) &= p_{01}^3 P(X_0 = 0) + p_{11}^3 P(X_0 = 1) \\ &= 0.248 \cdot 0.3 + 0.256 \cdot 0.7 \\ &= 0.0744 + 0.1792 = 0.2536 \end{aligned}$$

$$P^{(3)} = \begin{bmatrix} 0.752 & 0.248 \\ 0.744 & 0.256 \end{bmatrix}$$

8. Probabilités à l'équilibre

Exemple de la météo:

$$P = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.6 & 0.4 \end{bmatrix}$$

$$P^{(5)} = \begin{bmatrix} 0.75 & 0.25 \\ 0.75 & 0.25 \end{bmatrix}$$

$$P^{(6)} = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.6 & 0.4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.75 & 0.25 \\ 0.75 & 0.25 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.75 & 0.25 \\ 0.75 & 0.25 \end{bmatrix}$$

Après le jour 5, la probabilité qu'il pleuve $P(X_t = 1)$, $t \geq 5$

ne dépend pas des probabilités des états au départ: $P(X_0 = 0)$ et $P(X_0 = 1)$

$$\begin{aligned} P(X_t = 1) &= P(X_0 = 0) p_{01}^t + P(X_0 = 1) p_{11}^t \\ &= P(X_0 = 0) 0.25 + P(X_0 = 1) 0.25 = 0.25. \end{aligned}$$

8. Probabilités à l'équilibre

Exemple de la météo:

$$P = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.6 & 0.4 \end{bmatrix}$$

$$P^{(5)} = \begin{bmatrix} 0.75 & 0.25 \\ 0.75 & 0.25 \end{bmatrix}$$

$$P^{(6)} = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.6 & 0.4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.75 & 0.25 \\ 0.75 & 0.25 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.75 & 0.25 \\ 0.75 & 0.25 \end{bmatrix}$$

Probabilité qu'il fasse beau ($i = 1$) = 0.75
Probabilité de pluie ($i = 1$) = 0.25

} ne dépend plus de l'état initial du système

Donc en général quand il existe une valeur de n assez grande pour que les lignes de la matrice de transition $P^{(n)}$ soient identiques, alors la probabilité que le système se trouve dans l'état j ne dépend plus de l'état initial du système (à $t = 0$)

Les **probabilités à l'équilibre** sont des propriétés à long terme des chaînes de Markov

On peut démontrer que pour toute chaîne de Markov irréductible (ne comportant qu'une seule classe) qui est ergotie

$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^n$ existe et ne dépend pas de l'état i

De plus

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^n = \pi_j > 0$$

où les probabilités π_j

$$\pi_j = \sum_{i=0}^M \pi_i p_{ij}$$

$$\sum_{j=0}^M \pi_j = 1$$

$$P^{(5)} = P^{(6)} = \dots = \begin{bmatrix} 0.75 & 0.25 \\ 0.75 & 0.25 \end{bmatrix}$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{01}^{(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} p_{11}^{(n)} = 0.25$$

De plus

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^n = \pi_j > 0$$

où les probabilités π_j

$$\pi_j = \sum_{i=0}^M \pi_i p_{ij}$$

$$\sum_{j=0}^M \pi_j = 1$$

Le système précédent comporte $(M + 1)$ inconnus et $(M + 2)$ équations, et par conséquent une équation est redondante.

Si nous éliminons la dernière contrainte $\sum_{j=0}^M \pi_j = 1$, nous obtenons plusieurs

solutions à un multiple près.

$$\alpha \pi_j = \alpha \sum_{i=0}^M \pi_i p_{ij} = \sum_{i=0}^M \alpha \pi_i p_{ij}$$

Nous devons conserver cette dernière contrainte $\sum_{j=0}^M \pi_j = 1$ pour sauvegarder

la propriété des probabilités.

De plus

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^n = \pi_j > 0$$

où les probabilités π_j

$$\pi_j = \sum_{i=0}^M \pi_i p_{ij}$$

$$\sum_{j=0}^M \pi_j = 1$$

Le π_j est donc une **probabilité au stage d'équilibre** de se retrouver à l'état j après après un très grand nombre d'itérations **indépendemment de l'état initiale à $t = 0$**

De plus

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^n = \pi_j > 0$$

où les probabilités π_j

$$\pi_j = \sum_{i=0}^M \pi_i p_{ij}$$

$$\sum_{j=0}^M \pi_j = 1$$

Exemple de la météo:

$$\left. \begin{array}{l} \pi_0 = \pi_0 \cdot 0.8 + \pi_1 \cdot 0.6 \Rightarrow \pi_0 \cdot 0.2 = \pi_1 \cdot 0.6 \\ \pi_1 = \pi_0 \cdot 0.2 + \pi_1 \cdot 0.4 \Rightarrow \pi_1 \cdot 0.6 = \pi_0 \cdot 0.2 \end{array} \right\} \Rightarrow \pi_0 = 3\pi_1$$

$$P = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.6 & 0.4 \end{bmatrix}$$

$$\left. \begin{array}{l} \pi_0 + \pi_1 = 1 \\ \pi_0 = 3\pi_1 \end{array} \right\} \Rightarrow 4\pi_1 = 1 \Leftrightarrow \pi_1 = 0.25$$

Donc $\pi_1 = 0.25$ et $\pi_0 = 0.75$

π_j est une **probabilité stationnaire** (ne pas confondre avec le fait que les probabilités de transition sont stationnaires) dans le sens où si la probabilité initiale d'être dans l'état j est donné par π_j ($P(X_0 = j) = \pi_j$), alors la probabilité de retrouver le système dans l'état j aux temps $n = 1, 2, \dots$ est aussi π_j :

$$P(X_n = j) = \pi_j$$

Exemple de la météo:

Supposons que $P(X_0 = 0) = \pi_0 = 0.75$ et $P(X_0 = 1) = \pi_1 = 0.25$

Quelle est la probabilité qu'il pleuve le jour 3, $P(X_3 = 1)$?

$$\begin{aligned} P(X_3 = 1) &= p_{01}^3 P(X_0 = 0) + p_{11}^3 P(X_0 = 1) \\ &= 0.248 \cdot \pi_0 + 0.256 \cdot \pi_1 \\ &= 0.248 \cdot 0.75 + 0.256 \cdot 0.25 \\ &= 0.186 + 0.064 = 0.25 \end{aligned}$$

$$P^{(3)} = \begin{bmatrix} 0.752 & 0.248 \\ 0.744 & 0.256 \end{bmatrix}$$

- Si les états i et j sont récurrents dans des classes différentes alors

$$p_{ij}^{(n)} = 0 \quad \forall n \geq 1$$

- Si l'état j est transient alors

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = 0 \quad \forall i.$$

Donc la probabilité de retourner dans un état transient après un grand nombre d'itérations tend vers 0.

- On peut démontrer que pour une chaîne de Markov irréductible

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n p_{ij}^{(k)} \right) = \pi_j$$

9. Coût moyen (à long terme) par unité de temps

Soit un processus stochastique étant une chaîne de Markov

Considérons une fonction de coût définie par une variable aléatoire $C(X_t)$ définie pour les valeurs des états $\{0, \dots, M\}$:

$$C(0), \dots, C(M).$$

Supposons que la fonction $C(\cdot)$ soit indépendante du temps; i.e., $C(X_t)$ reste la même pour tous les temps t .

Soit un processus stochastique étant une chaîne de Markov irréductible et ergotie.

Considérons une fonction de coût définie par une variable aléatoire $C(X_t)$ définie pour les valeurs des états $\{0, \dots, M\}$:

$$C(0), \dots, C(M).$$

Supposons que la fonction $C(\bullet)$ soit indépendante du temps; i.e., $C(X_t)$ reste la même pour tous les temps t .

Le coût moyen associé à C pour les n premières périodes:

$$E \left[\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n C(X_t) \right].$$

Utilisant le résultat que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n p_{ij}^k \right) = \pi_j$$

on peut démontrer que le **coût moyen (à long terme) par unité de temps** est donné par

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n C(X_t) \right) = \sum_{j=0}^M \pi_j C(j)$$

Coût moyen (à long terme) par unité de temps est donné par

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n C(X_t) \right) = \sum_{j=0}^M \pi_j C(j)$$

Exemple de la météo:

Nous avons $\pi_1 = 0.25$ et $\pi_0 = 0.75$

Considérons une entreprise dont le coût d'exploitation $C(\bullet)$ dépend de la météo:

beau temps \rightarrow coût est de \$25 $\Rightarrow C(0) = 25$

pluie \rightarrow coût est de \$100 $\Rightarrow C(1) = 100.$

Coût d'exploitation moyen (à long terme) par unité de temps:

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^M \pi_j C(j) &= \pi_0 C(0) + \pi_1 C(1) \\ &= 0.75 \cdot 25 + 0.25 \cdot 100 \\ &= 18.75 + 25 = 43.75. \end{aligned}$$