

- N classes

- $g_1(\mathbf{x}), g_2(\mathbf{x}), \dots, g_N(\mathbf{x}) : \mathbb{R}^d \mapsto \mathbb{R}$

- fonction de décision:

$$f(\mathbf{x}) = C_i \text{ si } g_i(\mathbf{x}) \geq g_j(\mathbf{x}) \text{ pour tout } j = 1, \dots, N$$

- régions de décision: R_1, R_2, \dots, R_N

$$\mathbf{x} \in R_i \text{ si } f(\mathbf{x}) = C_i$$

- frontière de décision: $F \subset \mathbb{R}^d$

$$F = \{\mathbf{x} | \exists i, j : i \neq j, g_i(\mathbf{x}) = g_j(\mathbf{x})\}$$

- Deux classes $\{-1, 1\}$
 - $g(\mathbf{x}) = g_1(\mathbf{x}) - g_{-1}(\mathbf{x})$
 - fonction de décision: $f(\mathbf{x}) = \text{signe}(g(\mathbf{x}))$
 - régions de décision: $R_1 = \{\mathbf{x} : g(\mathbf{x}) \geq 0\}, R_{-1} = \{\mathbf{x} : g(\mathbf{x}) < 0\}$
 - frontière de décision: $F = \{\mathbf{x} | g(\mathbf{x}) = 0\}$

- La densité **normale** (gaussienne)

$$p(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{d/2} |\Sigma|^{1/2}} \exp \left[-\frac{1}{2} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^t \Sigma^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) \right]$$

- $\boldsymbol{\mu}$: vecteur de **moyenne**
- Σ : matrice de **covariance** (positive semidefinite)
- $|\Sigma|$: déterminante (≥ 0)
- Σ^{-1} : inverse (existe)

- Fonctions discriminantes

- $g_i(\mathbf{x}) = \ln p_i(\mathbf{x}) = \ln p(\mathbf{x}|Y = C_i) + \ln P(Y = C_i)$

- $g_i(\mathbf{x}) = -\frac{1}{2}(\mathbf{x} - \mu_i)^t \Sigma_i^{-1} (\mathbf{x} - \mu_i) - \frac{d}{2} \ln 2\pi - \frac{1}{2} \ln |\Sigma_i| + \ln P(Y = C_i)$

- Cas 1: $\Sigma_i = \sigma^2 \mathbf{I}$ (matrices de covariance sphériques)

- $|\Sigma_i| = \sigma^{2d}$

- $\Sigma^{-1} = \frac{1}{\sigma^2} \mathbf{I}$

$$\begin{aligned} g_i(\mathbf{x}) &= -\frac{\|\mathbf{x} - \mu_i\|^2}{2\sigma^2} + \ln P(Y = C_i) + \text{const.} \\ &= -\frac{1}{2\sigma^2} (\mathbf{x}^t \mathbf{x} - 2\mu_i^t \mathbf{x} + \mu_i^t \mu_i) + \ln P(Y = C_i) + \text{const.} \end{aligned}$$

- Cas 1: $\Sigma_i = \sigma^2 \mathbf{I}$

- fonctions discriminantes **linéaires**: $g'_i(\mathbf{x}) = \mathbf{w}_i^t \mathbf{x} + w_{i0}$

- vecteur de **poids**: $\mathbf{w}_i = \frac{1}{\sigma^2} \mu_i$

- **seuil** ou **biais**: $w_{i0} = -\frac{1}{2\sigma^2} \mu_i^t \mu_i + \ln P(Y = C_i)$

- frontière de décision **linéaire** entre R_i et R_j

$$(\mu_i - \mu_j)^t (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) = 0$$

- $\mathbf{x}_0 = \frac{1}{2}(\mu_i + \mu_j) + \left[\frac{\sigma^2}{\|\mu_i - \mu_j\|^2} \ln \frac{P(Y = C_i)}{P(Y = C_j)} \right] (\mu_j - \mu_i)$

- $P(Y = C_i) = P(Y = C_j)$: classifieur de **plus proche moyenne**

- Cas 2: $\Sigma_i = \Sigma$ (matrices de covariance identiques)

- $g_i(\mathbf{x}) = -\frac{1}{2}(\mathbf{x} - \mu_i)^t \Sigma^{-1}(\mathbf{x} - \mu_i) + \ln P(Y = C_i) + \text{const.}$

- $g'_i(\mathbf{x}) = \mathbf{w}_i^t \mathbf{x} + w_{i0}$

- vecteur de **poids**: $\mathbf{w}_i = \Sigma^{-1} \mu_i$

- **seuil** ou **biais**: $w_{i0} = -\frac{1}{2} \mu_i^t \Sigma^{-1} \mu_i + \ln P(Y = C_i)$

- Cas 2: $\Sigma_i = \Sigma$

- frontière de décision entre R_i et R_j :

$$\Sigma^{-1}(\mu_i - \mu_j)^t(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) = 0$$

- $\mathbf{x}_0 = \frac{1}{2}(\mu_i + \mu_j) + \left[\frac{1}{(\mu_i - \mu_j)^t \Sigma^{-1}(\mu_i - \mu_j)} \ln \frac{P(Y = C_i)}{P(Y = C_j)} \right] (\mu_j - \mu_i)$

- $P(Y = C_i) = P(Y = C_j)$: classifieur de plus proche moyenne selon la distance de Mahalanobis:

$$d(\mathbf{x}, \mu) = \sqrt{(\mathbf{x} - \mu)^t \Sigma^{-1}(\mathbf{x} - \mu)}$$

- Cas 3: $\Sigma_i =$ arbitraire

- $g_i(\mathbf{x}) = -\frac{1}{2}(\mathbf{x} - \mu_i)^t \Sigma_i^{-1} (\mathbf{x} - \mu_i) - \frac{1}{2} \ln |\Sigma_i| + \ln P(Y = C_i) + \text{const.}$

- fonctions discriminantes **quadratiques**: $g_i = \mathbf{x}^t \mathbf{W}_i \mathbf{x} + \mathbf{w}_i^t \mathbf{x} + w_{i0}$

- vecteur de **poids**: $\mathbf{w}_i = \Sigma_i^{-1} \mu_i$

- $\mathbf{W}_i = -\frac{1}{2} \Sigma_i^{-1}$

- **seuil** ou **biais**: $w_{i0} = -\frac{1}{2} \mu_i^t \Sigma_i^{-1} \mu_i - \frac{1}{2} \ln |\Sigma_i| + \ln P(Y = C_i)$

- **frontière de décision** entre R_i et R_j : **hyperquadriques**